[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ECOCOLOR DOPPLER ARTI INFERIORI ARTERIOSO

Normale modulazione dei complessi velocimetrici.
Assenza di turbolenze al segnale doppler.
Le arterie esaminate hanno pareti normo-ecogene e calibro regolare.
Non sono presenti alterazioni significative delle velocit à del flusso sanguigno. API Index (indice di Winsor)= 1.
Conclusioni: esame nella norma

ECOCOLOR DOPPLER ARTI INFERIORI VENOSO

SISTEMA VENOSO PROFONDO - (compartimento femorale : v.femorale com. e prof.,v. fem.sup.,v.poplitea) Vene pervie e collassabili con la pressione mediante la sonda ecografica.
Non sono presenti trombi nei lumi vasali.
Non vi è reflusso durante la manovra di Valsalva e/o di compressione.

SISTEMA VENOSO SUPERFICIALE - (safena interna e safena esterna)
continenza dell'ostio-safeno-femorale
continenza dell'ostio-safeno-popliteo.

SISTEMA ANASTOMOTICO DELLE VENE PERFORANTI :
continenti le perforanti(gruppo di Dodd) a livello di coscia.
continente la perforante di Boyd (III sup. di gamba)
in continenti le perforanti di Cockett
continente vena paratibiale (perf.di Sherman)
continente la v.perforante di Bassi
continente punto gastrocnemio di MAY
asse arterioso pervio.
Indice ABI : 1
lacune linfatiche bilaterali
Conclusioni: insufficienza venosa Classe C1 CEAP

ECOCOLOR DOPPLER TRONCHI SOVRAAORTICI

Carotidi di normale calibro e decorso.
Ispessimento parietale diffuso.
IMT max 1,2mm.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

mm, PPtd 13 mm)
Sezioni destre nei limiti. Atrio sinistro dilatato.Aorta sclerotica:normali le dimensioni alla radice, seni di valsalva e tratto ascendente.
Degenerazione fibrosclerotica degli elementi valvolari , insuffcienza mitralica di grado lieve-moderato.

Assenza di anomalie cinetiche regionali e globali del ventricolo sinistro con frazione

ECOGRAFIA CARDIACA M-MODE 2D E COLOR DOPPLER

Esame di qualità tecnica sufficiente per una valutazione morfofunzionale.
Diametri cavitari delle sezioni cardiache ai limiti della norma.
Aumento degli spessori parietali del ventricolo sinistro (ipertrofia concentrica SIV td 13 mm, PPtd 13 mm)
Sezioni destre nei limiti. Atrio sinistro dilatato.Aorta sclerotica:normali le dimensioni alla radice, seni di valsalva e tratto ascendente.
Degenerazione fibrosclerotica degli elementi valvolari , insuffcienza mitralica di grado lieve-moderato.

Assenza di anomalie cinetiche regionali e globali del ventricolo sinistro con frazione d'eiezione nei limiti della norma (FE stimata a riposo: 60 %).
Minima fada pericardica (4 mm) . Patterns flussimetrici doppler transvalvolari: alterato rilasciamento diastolico. Si allegano parametri di misurazione.

[redacted]

[redacted]